



TITLE:

# 非線形半群の偏微分方程式への応用 (発展系と非線型問題)

AUTHOR(S):

高橋, 匡康

---

CITATION:

高橋, 匡康. 非線形半群の偏微分方程式への応用 (発展系と非線型問題). 数理解析研究所講究録 1973, 184: 85-99

ISSUE DATE:

1973-08

URL:

<http://hdl.handle.net/2433/107178>

RIGHT:

## 非線形半群の偏微分方程式への応用

航技研 高橋匡康

## §1. 序

本稿では非線形半群の近似に関する結果とそれの偏微分方程式の Cauchy 問題への応用を報告する。

これまでに Brezis-Pazy [1], Miyadera [6], Miyadera-Oharu [7] 等により, 非線形半群の近似に関していくつかの結果が得られている。我々はこのでは差分近似をモデルとした非線形半群の収束定理を与え, としてその応用として次の 1 階準線形方程式に対する Cauchy 問題

$$(CP) \quad \begin{cases} u_t + \sum_{i=1}^d \varphi_i(u) x_i = 0 & t > 0, x = (x_1, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d \\ u|_{t=0} = u_0(x) \end{cases}$$

の差分近似を考察する。

この Cauchy 問題は Kružkov [5], Kojima [4], Crandall [2] 等により研究されている。特に, Kružkov はより一般的な形の方程式に対する Cauchy 問題の“解”の存在と一意性に関して

重要な結果を得ている。彼の解の構成法は "vanishing viscosity method" による。Kojima は同じ問題を差分近似の立場から論じている。一方, Quinn [9] によってこの種の問題の半群理論の立場からの取り扱いの可能性が示された。そして実際, Crandall は半群理論の立場からこの問題を取り扱うことに成功している。本稿の目的は非線形半群の近似理論の立場から (CP) の差分近似を論じることである。

## §2. 準備

この節では以下で必要とされる諸概念について簡単にふれておく。

$X$  は Banach 空間を表わす。 $X$  に於ける (多価) 作用素  $A$  が dissipative operator であるとは, 任意の  $u_i \in D(A)$ ,  $v_i \in Au_i$ ,  $i=1, 2$ , そして任意の  $\lambda > 0$  に対して

$$(2.1) \quad \|u_1 - u_2\| \leq \|(u_1 - \lambda v_1) - (u_2 - \lambda v_2)\|$$

が成立することという。

また,  $X$  に於ける縮小作用素の族  $\{J_\lambda; \lambda > 0\}$  が pseudo-resolvent であるとは, 任意の  $\lambda, \mu > 0$  と  $u \in D(J_\lambda)$  に対して  $R(\frac{\mu}{\lambda} + (1 - \frac{\mu}{\lambda})J_\lambda) \subset D(J_\mu)$  であり, さらに

$$(2.2) \quad J_\lambda u = J_\mu \left[ \frac{\mu}{\lambda} u + (1 - \frac{\mu}{\lambda}) J_\lambda u \right]$$

となることという。

dissipative operator と pseudo-resolvent との関係は次の命題によって示される。

命題 2.1. (Okaru [8]).

(i)  $A$  を  $X$  に於ける dissipative operator とし,  $J_\lambda = (I - \lambda A)^{-1}$ ,  $\lambda > 0$ , とおくと  $\{J_\lambda; \lambda > 0\}$  は pseudo-resolvent である。

(ii)  $\{J_\lambda; \lambda > 0\}$  を  $X$  に於ける pseudo-resolvent とすると,  $R(J_\lambda)$  は  $\lambda$  に関して一定であり, 各  $\lambda > 0$  に対して  $J_\lambda = (I - \lambda A)^{-1}$  となるような  $D(A) \equiv R(J_\lambda)$  で定義される dissipative operator  $A$  が存在する。

さらに, (i) と (ii) に於いて,  $A$  の 1 価性とある  $J_{\lambda_0}$  が injective であることとは同値である。

最後に, 非線形半群についてふれよう。  $C$  を  $X$  の部分集合とする。  $C$  からそれ自身への縮小作用素の全体を記号  $\text{Cont}(C)$  でもって表わす。縮小作用素から成る半群の生成に関しては次の定理が知られている (Crandall-Liggett [6])。

定理 2.2. (生成定理)

$X$  に於ける dissipative operator  $A$  が range condition

$$(R) \quad R(I - \lambda A) \supset D(A), \quad \lambda > 0$$

を満足しているとする。すると各  $u \in D(A)$  と  $t \geq 0$  に対して

$$(2.3) \quad T(t)u = \lim_{h \rightarrow 0} (I - hA)^{-[\frac{t}{h}]} u = \lim_{k \rightarrow \infty} (I - \frac{t}{k} A)^{-k} u$$

となるような半群  $\{T(t); t \geq 0\} \subset \text{Cont}(\overline{D(A)})$  が存在する。

さらに、各  $u \in D(A)$  と  $t \geq 0$  に対して次の評価

$$(2.4) \quad \|T(t)u - (I - hA)^{-[t/h]}u\| \leq 2\sqrt{th} \|Au\|$$

が成立する。

### §3. 収束定理

この節では差分近似をモデルとした半群の収束定理を与える。得られる結果は [1], [7] に与えられた収束定理の modified version である。

$\{X_m\}_{m \geq 1}$  は  $X$  の closed convex set から成る単調増加列,  $X_0 = \bigcup_{m \geq 1} X_m$  は linear manifold とする。また,  $\{C_{m,n}\}_{m,n \geq 1}$  を各  $m$  毎に  $\{C_{m,n}\}_{n \geq 1} \subset \text{Cont}(X_m)$  となるような作用素の列, として,  $\{h_{m,n}\}_{m,n \geq 1}$  は各  $m$  毎に  $n \rightarrow \infty$  の時  $h_{m,n} \rightarrow 0$  となるような正数列とする。さらに,  $A_{m,n} = h_{m,n}^{-1}(C_{m,n} - I)$  と定義する。容易にわかるように, 各  $A_{m,n}$  は dissipative であり, range condition (R):  $R(I - \lambda A_{m,n}) \supset X_m = D(A_{m,n}), \lambda > 0$ ,

を満足する。従って, 定理 1, 2 により, 各  $A_{m,n}$  は半群  $\{T_{m,n}(t); t \geq 0\} \subset \text{Cont}(X_m)$  を生成する。さらに, 各  $u \in X_m$  に対して  $T_{m,n}(t)u \in C^1([0, \infty); X)$  で

$$(d/dt)T_{m,n}(t)u = A_{m,n}T_{m,n}(t)u, \quad t \geq 0$$

であることもわかる。

この様な formulation でもって次の収束定理を得る:

定理 3.1.

$\{X_m\}$ ,  $\{C_{m,n}\}$  と  $\{A_{m,n}\}$  に対して次の条件が満足されて  
いるとする:

(C) 各  $\lambda > 0$  と  $u \in X_m$  に対して収束

$$J_\lambda u = \lim_{n \rightarrow \infty} (I - \lambda A_{m,n})^{-1} u$$

が成立するような pseudo-resolvent  $\{J_\lambda; \lambda > 0\} \subset \text{Cont}(X_0)$  が  
存在する。

この時、次の結論を得る:

(i) 各  $\lambda > 0$  に対して  $J_\lambda = (I - \lambda A)^{-1}$ , さらに  $R(I - \lambda A) = X_0$   
 $\supset D(A)$  となるような dissipative operator  $A$  が存在する。

(ii)  $A$  は半群  $\{T(t); t \geq 0\} \subset \text{Cont}(\overline{D(A)})$  を生成し、集合  
 $X_0 \cap \overline{D(A)}$  は各作用素  $T(t)$  のもとで invariant である。

(iii) 各  $u \in X_m \cap \overline{D(A)}$  と  $t \geq 0$  に対して収束

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T_{m,n}(t) u = T(t) u$$

が成立する。ここにこの収束は各 compact  $t$ -interval 上一様に  
成り立つ。

(iv) 各  $u \in X_m \cap \overline{D(A)}$  と  $t \geq 0$  に対して収束

$$\lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \forall h_{m,n} \rightarrow t}} C_{m,n}^\vee u = T(t) u$$

が成立する。

系 3.2.

定理 3.1 の条件 (C) に加えて、次の条件が満足されるものとする：

(C<sub>1</sub>) ある 1 個の作用素  $A_1$  とある集合  $D \subset X_0$  が存在して  
各  $u \in X_m \cap D$  に対して収束

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_{m,n} u = A_1 u \in X_0$$

が成立する。

この時、 $D \subset D(A)$  であり各  $u \in D$  に対して  $A_1 u \in Au$  が成立する。従って、もし  $D$  が  $X_0$  に於いて dense であるならば、定理 3.1 の結論 (ii), (iii) をして (iv) に於ける集合  $X_0 \cap \overline{D(A)}$ ,  $X_m \cap \overline{D(A)}$  はそれぞれ  $X_0$ ,  $X_m$  によって置きかえることができる。

## §4. 差分近似

以下では、次の Cauchy 問題を論じる：

$$(CP) \quad \begin{cases} u_t + \sum_{i=1}^d \varphi_i(u) x_i = 0 & t > 0, \quad x \in \mathbb{R}^d \\ u|_{t=0} = u_0(x). \end{cases}$$

ここに、各  $\varphi_i$  が class  $C^1(\mathbb{R}^1)$  に属し、 $\varphi_i(0) = 0$  となることを仮定する。

Kružkov と Kojima は空間  $L^\infty = L^\infty(\mathbb{R}^d)$  に於いて (CP) を論じている。我々はここでは、Crandall と同じように空間  $L^1 = L^1(\mathbb{R}^d)$

に於いて (CP) を論じることとする。

(CP) の解は、Kruzkov にならう。次の定義の意味で考えることにする。

#### 定義 4.1.

$u_0 \in L^1 \cap L^\infty$  とする。今  $[0, \infty)$  で定義された  $L^1 \cap L^\infty$ -値関数  $u(t) \equiv u(t; \cdot)$  が初期値  $u_0$  をもつ (CP) の一般化された解であるとは、次の 3 条件が成立することという：

(G.1)  $\|u(t)\|_\infty$  は  $[0, \infty)$  上で一様有界。

(G.2) 任意の実数  $k$  と非負関数  $f \in C_0^\infty((0, \infty) \times \mathbb{R}^d)$  に対して

$$\int_0^\infty \int_{\mathbb{R}^d} \{ |u(t, x) - k| f_t(t, x) + \text{sign}(u(t, x) - k) \sum_{i=1}^d [\varphi_i(u(t, x)) - \varphi_i(k)] f_{x_i}(t, x) \} dx dt \geq 0$$

(G.3)  $u(t)$  は  $[0, \infty)$  上強連続で、 $\lim_{t \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^d} |u(t, x) - u_0(x)| dx = 0$ 。

さて、定理 3.1 を適用して、(CP) の一般化された解を差分近似の立場から構成しよう。そのために、(CP) に対して次のような Friedrichs type の近似差分系を考える：

$$(DS) \begin{cases} h^{-1} [u^{v+1}(x) - (2d)^{-1} \sum_{i=1}^d (u^v(x+le_i) + u^v(x-le_i))] \\ \quad + (2d)^{-1} \sum_{i=1}^d [\varphi_i(u^v(x+le_i)) - \varphi_i(u^v(x-le_i))] = 0 \\ \quad h, l > 0, x \in \mathbb{R}^d; v=0, 1, 2, \dots \\ u^0(x) = u_0(x) \end{cases}$$

これに対応する差分作用素  $C_{h,l}$ ,  $h, l > 0$ , は



$$(4.1) \quad [C_{h,q}u](x)$$

$$= (2d)^{-1} \sum_{i=1}^d (u(x+le_i) + u(x-le_i)) - \frac{h}{2d} \sum_{i=1}^d [\varphi_i(u(x+le_i)) - \varphi_i(u(x-le_i))]$$

によって定義する。ここに  $D(C_{h,q}) = \{u \in L^1; C_{h,q}u \in L^1\}$  である。これによって (DS) は次の様に書き直すことができる。

$$(DS) \quad u^v = C_{h,q}^v u_0, \quad v=0,1,2,\dots$$

次に、

$$X_m = \{u \in L^1 \cap L^\infty; \|u\|_\infty \leq m\}, \quad m=1,2,3,\dots$$

$$X_0 = \bigcup_{m \geq 1} X_m = L^1 \cap L^\infty$$

とおく。さらに

$$M_m = \max_{1 \leq i \leq d} \sup_{|s| \leq m} |\varphi'_i(s)|$$

とおく。また、正数列  $\{\delta_m\}$  と  $\delta_m \leq \frac{1}{dM_m}$  となる様にとる。

この様な数列  $\{M_m\}$  と  $\{\delta_m\}$  に対して正数よりなる 2重数列  $\{h_{m,n}\}$  と  $\{l_{m,n}\}$  を次の様にとる：各  $m$  を固定する毎に

$$h_{m,n}, l_{m,n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

$$(4.2) \quad \delta_m \leq h_{m,n}/l_{m,n} \leq 1/dM_m, \quad (n \geq 1).$$

すると、 $C_{h_{m,n}, l_{m,n}}$  は  $X_m$  上で well-defined であるから

$$(4.3) \quad \begin{cases} C_{m,n} = C_{h_{m,n}, l_{m,n}}|_{X_m} \\ A_{m,n} = h_{m,n}^{-1} (C_{m,n} - I) \end{cases}$$

と定義することが出来る。

定理 3.1 と系 3.2 を適用して、次の定理を証明できる：

定理 4.2.

$\{C_{min}\}$  と  $\{A_{min}\}$  を (4.3) で定義された様な差分作用素とすると以下のことが成立する:

(i) 定義域が  $C_0^1(\mathbb{R}^d) \subset D(A) \subset X_0$  となるような  $L^1$  に於ける 1 個の dissipative operator  $A$  が存在する, さらに, 各  $u \in D(A)$  に対して

$$Au = -\sum_{i=1}^d \varphi_i(u) x_i$$

となる。ここで微分は超関数の意味で考える。

(ii) 任意の  $\lambda > 0$  と  $u \in X_m$  に対して収束

$$(I - \lambda A)^n u = \lim_{n \rightarrow \infty} (I - \lambda A_{min,n})^n u$$

が成立し,  $(I - \lambda A)^n u$  は偏微分方程式

$$v + \lambda \sum_{i=1}^d \varphi_i(v) x_i = u, \quad v \in D(A)$$

の解を与える; この事実は,  $R(I - \lambda A) = X_0$ ,  $\lambda > 0$ , であることと示して 113。

(iii) 各  $u \in X_0$  に対して収束

$$T(t)u = \lim_{k \rightarrow \infty} (I - \frac{t}{k} A)^k u$$

が成立し, 極限作用素  $T(t)$ ,  $t \geq 0$ , は  $X_0$  上の  $L^1$ -contractive semigroup  $\{T(t); t \geq 0\}$  を成す。そして  $u(t, x) = [T(t)u](x)$  は定義 4.1 の意味での (CP) の一意な一般化された解となる。

(iv) 各  $u \in X_m$  に対して,  $n \rightarrow \infty$ ,  $v_{h_m, n} \rightarrow t$  とするとき  $C_{min}^v u$  は  $T(t)u$  に強収束する。

§5. 定理4.2の証明.

定理4.2を証明するために、いくつかの補題を準備しよう。  
次の補題は(DS)に対する stability condition であると考えられる。

補題 5.1.

各  $m$  毎に,  $\{C_{m,n}\}_{n \geq 1} \subset \text{Cont}(X_m)$ . さらに

$$\|C_{m,n} u\|_p \leq \|u\|_p, \quad u \in X_m, \quad m, n \geq 1, \quad p=1, \infty$$

が成立する。

次に, notation を簡単にするために次の記号を導入する。

$\mathbb{R}^d$  上の実数値関数  $u(x)$  に対して

$$[D_i^0 u](x) = (2l)^{-1} [u(x+le_i) - u(x-le_i)]$$

$$(5.1) \quad [D_i^+ u](x) = l^{-1} [u(x+le_i) - u(x)]$$

$$[D_i^- u](x) = l^{-1} [u(x) - u(x-le_i)], \quad l > 0, \quad x \in \mathbb{R}^d$$

と表わす。この時,

$$[D_i^- D_i^+ u](x) = l^{-2} [u(x+le_i) - 2u(x) + u(x-le_i)]$$

となる。また,  $u \in L^1$  と  $f \in L^\infty$  との pairing を  $\langle u, f \rangle$  で表わす。これらの notation のもとで次の評価を得る。

補題 5.2.

$u \in X_m$  とすると,  $|k| \leq m$  となる様な任意の定数  $k$  と非負関数  $f \in C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$  に対して

$$(5.2) \quad \langle \text{sign}(u-k) A_{m,n} u, f \rangle$$

$$\leq (2d)^{-1} \sum_{i=1}^d \langle |u-k|, \frac{h^2}{h} D_i^- D_i^+ f \rangle + \sum_{i=1}^d \langle \text{sign}(u-k) (\varphi_i(u) - \varphi_i(k)), D_i^0 f \rangle$$

が成立する。

注意. 補題 5.2 の証明から次のことがわかる。

$v \in X_m$  とし,  $f \in C^0(\mathbb{R}^d)$  は  $f(x), f_{x_i}(x), i=1,2,\dots,d$ , が  $\mathbb{R}^d$  で一様有界となるような非負関数とすると, 次の評価式が得られる:

$$(5.3) \quad \langle \text{sign}(v) A_{m,n} v, f \rangle \leq \left( \frac{1}{d\delta_m} + M_m \right) \left( \sum_{i=1}^d \sup_x |f_{x_i}(x)| \right) \|v\|_1.$$

(5.3) の評価を用いて次の結果を得る:

補題 5.3.

$u \in X_m, \lambda > 0$  とすると  $v_n = (I - \lambda A_{m,n})^n u, n=1,2,3,\dots$ , に対して次の評価が成立する:

$$(i) \quad \|v_n\|_p \leq \|u\|_p, \quad n \geq 1, \quad p=1, \infty.$$

$$(ii) \quad \int_{\mathbb{R}^d} |v_n(x+y) - v_n(x)| dx \leq \int_{\mathbb{R}^d} |u(x+y) - u(x)| dx, \quad y \in \mathbb{R}^d, \quad n \geq 1.$$

$$(iii) \quad n \text{ に関して一様 } p \rightarrow +\infty \text{ とする時 } \int_{|x|>p} |v_n(x)| dx \rightarrow 0.$$

これらの事実から列  $\{(I - \lambda A_{m,n})^n u\}_{n \geq 1}$  が  $L^1$  に於いて conditionally compact であることを示してゐる。

補題 5.4.

$u, v \in X_m, \lambda > 0, p \geq m$  とする。そして  $w_n = (I - \lambda A_{m,n})^n u,$

$z_n = (I - \lambda A_{p,n})^{-1} u$ ,  $n=1, 2, 3, \dots$ , とおく。  $w$  と  $z$  はそれぞれ  $\{w_n\}$  と  $\{z_n\}$  の cluster point とするならば

$$(5.4) \quad \|w - z\|_1 \leq \|u - v\|_1$$

が成立する。この事実から特に、各  $u \in X_m$  と  $\lambda > 0$  に対して、 $\{(I - \lambda A_{m,n})^{-1} u\}_{n \geq 1}$  が  $L^1$  に於いて収束列であり、その極限が  $m$  に依存しないことを示して置く。

補題 5.1 ~ 5.4 から次の定理が得られる:

定理 5.5.

(i) 任意の  $u \in C_0^1(\mathbb{R}^d) \cap X_m$  に対して収束

$$(5.5) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} A_{m,n} u = - \sum_{i=1}^d \varphi_i(u) x_i = - \sum_{i=1}^d \varphi_i'(u) u x_i$$

が成立する。ここで微分は通常の意味での微分である。

(ii) 任意の  $\lambda > 0$  と  $u \in X_m$  に対して収束

$$(5.6) \quad J_\lambda u = \lim_{n \rightarrow \infty} (I - \lambda A_{m,n})^{-1} u$$

が成立するような pseudo-resolvent  $\{J_\lambda; \lambda > 0\} \subset \text{Cont}(X_0)$  が存在する。さらに、各  $\lambda > 0$  と  $u \in X_0$  に対して  $J_\lambda u$  は偏微分方程式

$$(5.7) \quad u = v + \lambda \sum_{i=1}^d \varphi_i(v) x_i$$

の解を与える。ここに微分は超関数の意味で考える。

定理 5.5 は、定理 3.1 の条件 (C), そして  $D = C_0^1(\mathbb{R}^d)$  に対し

系 3.2 の条件 (C<sub>1</sub>) が成立することと示して 113。従って、 $C_0(\mathbb{R}^d) \subset D(A) \subset L^1 \cap L^\infty$ ,  $J_\lambda = (I - \lambda A)^{-1}$ ,  $\lambda > 0$ , とするような dissipative operator  $A$  が存在する。また (5.7) から各  $J_\lambda$  は injective である。従って、命題 1.1 により  $A$  は 1 価である。以上のことから、定理 3.1 と系 3.2 を用いて、定理 4.2 の結論は (iii) を除いてすべて証明された。各  $u \in X_0$  に対して、 $u(t, x) = [T(t)u](x)$  が (CP) の一般化された解となることは、(ii) の収束あるいは (iv) の収束を用いて証明できる。

## §6. Crandall の結果との関係

最後に、上で得られた結果と Crandall の結果との関係と述べておこう。Crandall は次の様な作用素  $A_0$  を導入して 113。

### 定義 6.1.

$u \in D(A_0)$  であって  $v \in A_0 u$  であるとは、 $u, v \in L^1$  であって  $\varphi_i(u) \in L^1$ ,  $i=1, 2, \dots, d$ , となり、任意の非負関数  $f \in C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$  と任意の実数  $k$  に対して

$$\int_{\mathbb{R}^d} \text{sign}(u(x) - k) \left\{ \sum_{i=1}^d [\varphi_i(u(x)) - \varphi_i(k)] f_{x_i}(x) + v(x) f(x) \right\} dx \geq 0$$

となることをいう。

$A_0$  は一般に多価である。Crandall は各  $\varphi_i$  が class  $C^1(\mathbb{R}^1)$  に属し  $\varphi_i(0) = 0$  であるとき  $-A_0$  が  $L^1$  に於いて  $m$ -dissipative であ

ることを示し, 定理 1.1 を用いて  $L^1$  上の半群  $\{T(t); t \geq 0\} \subset \text{Cont}(L^1)$  を構成している。さらに, 初期値  $u$  が  $L^1 \cap L^\infty$  に属するときには,  $u(t, x) = [T(t)u](x)$  が (CP) の一般化された解となることを示している。

定理 4.2 に於いて得られた作用素  $A$  は定義 6.1 で述べた作用素  $A_0$  と次の関係をもつ:

命題 6.2.

$D(A) = \{u \in D(A_0); u, A_0 u \in L^\infty\}$ , として  $A = -A_0|_{D(A)}$  が成立する。

この命題から  $\bar{A} = -\bar{A}_0$  となり, 両者は  $L^1$  に於いて  $m$ -dissipative である。そして定理 4.2 (iii) に於いて得られた半群  $\{T(t); t \geq 0\}$  を  $L^1$  全体に拡張したものは Crandall の半群と一致する。以上の結果の詳しい証明並びに詳しい議論については, [10] を参照されたい。

#### References

- [1] H. Brezis and A. Pazy, Convergence and approximation of semigroups of nonlinear operators in Banach spaces, J. Func. Anal., 9 (1970), 63-74.
- [2] M. Crandall, The semigroup approach to first order quasilinear equations in several space variables, to appear in Israel J. Math..
- [3] M. Crandall and T. Liggett, Generation of semigroups of nonlinear transformations on general Banach spaces, Amer. J. Math., 93 (1971), 265-298.

- [4] K. Kojima, in preparation.
- [5] S. N. Kružkov, First order quasilinear equations in several independent variables, Math. USSR Sbornik, 10 (1970), 217-243. (Russian).
- [6] I. Miyadera, On the convergence of nonlinear semi-groups, II, J. Math. Soc. Japan, 21 (1969), 403-412.
- [7] I. Miyadera and S. Oharu, Approximation of semigroups of nonlinear operators, Tôhoku Math. J., 22 (1970), 24-47.
- [8] S. Oharu, On the generation of semigroups of nonlinear contractions, J. Math. Soc. Japan, 22 (1970), 526-550.
- [9] B. Quinn, Solutions with shocks: An example of an  $L^1$ -contractive semigroup, Comm. Pure. Appl. Math., 24 (1971), 125-132.
- [10] S. Oharu and T. Takahashi, A convergence theorem of nonlinear semigroups and its application to first order quasilinear equations, to appear.